

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ “กัญชา”

ทางการแพทย์ รูปแบบหยดใต้ลิ้น มีดังนี้



1 บ้วนปากด้วยน้ำเปล่า
กลืนน้ำลาย

2 เปิดปากยกลิ้นของคุณให้สัมผัส
กับเพดานปากจากนั้นหยดยาที่ใต้ลิ้น
1 หยด

3 รอประมาณ 1 นาที ให้ยาดูดซึม
เข้าใต้ลิ้นพยายามอย่ากลืนน้ำลาย
ในช่วงนี้ หลังจาก 1 นาทีแล้วสามารถ
กลืนน้ำลายและหยดยาหยดต่อไปได้

4 หลังจากที่ย่อยยาครบตาม
จำนวนที่แพทย์สั่ง ไม่ควรบ้วนปาก
ดื่มน้ำ หรือกินอาหาร เป็นเวลา 5-10
นาที หลังจากนั้นไม่มีข้อจำกัด ในการ
บ้วนปาก ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหาร



ข้อมูลโดย : กลุ่มงานเภสัชกรรม
เผยแพร่โดย : กลุ่มงานสุขศึกษา
มกราคม 2563



หากมีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้
สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

อาการผิดปกติที่พบได้บ่อย

- ❖ ง่วงนอนมากกว่าปกติ
- ❖ คลื่นไส้อาเจียน
- ❖ ปากแห้ง
- ❖ มีเวียนศีรษะปวดศีรษะ

อาการผิดปกติที่ควรไปพบแพทย์

- ❖ หัวใจเต้นเร็วและรัวผิดปกติ
- ❖ เป็นลมหมดสติ
- ❖ เจ็บหน้าอก ราวไปทีแชน
- ❖ เหนื่อยแตก ตัวสั่น
- ❖ อึดอัดหายใจไม่สะดวก
- ❖ เดินเซ พุดไม่ชัด
- ❖ สับสน กระวนกระวาย วิดก
กังวล หวาดระแวง
- ❖ หูแว่ว เห็นภาพหลอน พุดคน
เดียว อารมณ์แปรปรวน

❖ ข่าวประชาสัมพันธ์



คำแนะนำ การใช้ “กัญชา”

ทางการแพทย์อย่างปลอดภัย
สำหรับผู้ป่วย





ผลิตภัณฑ์ “กัญชา”

สำหรับการแพทย์แผนปัจจุบัน

ในประเทศไทย มีการพัฒนาและวิจัยในรูปแบบของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชา สำหรับหยดใต้ลิ้น เพื่อให้ดูดซึมในช่องปาก โดยมีปริมาณสารสำคัญ THC และ CBD ในความเข้มข้นและอัตราส่วนต่างๆ เช่น

สูตรตำรับที่มี THC เด่น

สูตรตำรับที่มี CBD เด่น

และสูตรตำรับที่มี THC และ CBD

ในอัตราส่วนที่เท่ากัน เพื่อให้ครอบคลุม การรักษาโรคหรือภาวะของโรคที่หลากหลาย

สิ่งที่ผู้ป่วย

เริ่มใช้สารสกัดกัญชา **ควรทราบ !!**

1 จำเป็นต้องทราบข้อมูลก่อนรักษา

✓ สารสกัดกัญชา

ไม่ใช่ทางเลือกแรกในการใช้รักษา

✓ ใช้รักษาเสริมจากการรักษาตามมาตรฐาน

ไม่หยุดการรักษาที่รับอยู่ในปัจจุบัน

✓ ผู้ป่วยต้องทราบประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

✓ ควรใช้สารสกัดกัญชาที่ได้มาตรฐาน และทราบอัตราส่วนสารสำคัญ(THC และ CBD) ที่ชัดเจน

2 เมื่อเริ่มใช้สารสกัดกัญชา

✓ ควรเริ่มในปริมาณที่น้อยที่สุด

หากยังไม่ได้ผล ต้องปรับเพิ่มปริมาณซ้ำๆ

✓ ควรมีผู้ดูแลอยู่ด้วยเมื่อเริ่มใช้ หากเกิดผลข้างเคียง ให้รีบนำผู้ป่วยพบแพทย์ทันที

✓ การใช้สารสกัดจากกัญชาในครั้งแรก ควรใช้ก่อนนอนและมีผู้ดูแลใกล้ชิด

3 แจ้งให้แพทย์ทราบว่าใช้ยาประเภทใดอยู่

✓ สารสกัดกัญชาอาจส่งผลต่อยาบางชนิดที่ผู้ป่วยใช้ประจำ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้

ข้อควรปฏิบัติ

ในการใช้

ผลิตภัณฑ์ “กัญชา” อย่างปลอดภัย

1 ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

2 ควรปรึกษาแพทย์/เภสัชกรหากจะใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาพร้อมกับยาอื่นที่นอกเหนือจากแพทย์สั่ง

3 ไม่ควรขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

4 หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาพร้อมกับแอลกอฮอล์/สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

5 หลีกเลี่ยงการใช้กัญชาจากแหล่งอื่นๆร่วมด้วย เช่น การสูบ การรับประทาน ยาต้มยาขง

6 จัดเก็บผลิตภัณฑ์กัญชาในที่ปลอดภัยให้พ้นมือเด็กและอยู่ห่างจากเยาวชน

7 ห้ามนำผลิตภัณฑ์กัญชาของท่านไปให้ผู้อื่นใช้ การที่ท่านใช้แล้วได้ผลดี ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะมีประโยชน์

การใช้กัญชาทางการแพทย์ถือเป็นยาใหม่และไม่ใช่ยาครอบจักรวาล ดังนั้นต้องใช้อย่างระมัดระวังควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนอย่างเข้าใจ